

医薬品の適正使用に欠かせない  
情報です。必ずお読みください。

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

HIVプロテアーゼ阻害剤  
**レイアタツツ<sup>®</sup>カプセル150mg**  
**レイアタツツ<sup>®</sup>カプセル200mg**  
**REYATAZ<sup>®</sup> CAPSULES**  
 (アタザナビル硫酸塩カプセル)

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社  
 東京都新宿区西新宿6-5-1

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂しましたので、お知らせいたします。  
 今後のご使用に際しましては、新しい「添付文書」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂の概要】（詳細につきましては、以下をご参照ください。）

### 1. 「禁忌」及び「相互作用」の「併用禁忌」の項：

「ロミタピドメシル酸塩」を追記

自主改訂

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 No.289」に掲載されます。

流通在庫の関係から改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまで若干の日数が必要ですので、既にお手元にある製品のご使用に際しましては、この「お知らせ」の内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

### 【改訂内容】

改訂後	改訂前
<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</p> <p>1. ～2. 略</p> <p>3. 次の薬剤を投与中の患者：リファンピシン、イリノテカン塩酸塩水和物、(略)、ロバスタチン（国内未発売）、<u>ロミタピドメシル酸塩</u>、バルデナフィル塩酸塩水和物、(略)</p>	<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</p> <p>1. ～2. 略</p> <p>3. 次の薬剤を投与中の患者：リファンピシン、イリノテカン塩酸塩水和物、(略)、ロバスタチン（国内未発売）、バルデナフィル塩酸塩水和物、(略)</p>

改訂後			改訂前		
3. 相互作用 (略) (1) 併用禁忌 (併用しないこと)			3. 相互作用 (略) (1) 併用禁忌 (併用しないこと)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	CYP3A4に対する競合による。	(略)	(略)	CYP3A4に対する競合による。
シンバスタチン (リポバス) ロバスタチン (国内未発売)	(略)		シンバスタチン (リポバス) ロバスタチン (国内未発売)	(略)	
<u>ロミタピドメシル酸塩 (ジャクスタピッド)</u>	本剤によりロミタピドの血中濃度が著しく上昇するおそれがある。		バルデナフィル塩酸塩水和物 (レビトラ)	(略)	
バルデナフィル塩酸塩水和物 (レビトラ)	(略)		(略)	(略)	
(略)	(略)				

(下線部：追加改訂箇所)

### 【改訂理由】

CCDS\*が改訂され、ロミタピドの併用禁忌が追記されたこと、並びに、ジャクスタピッドカプセル（一般名：ロミタピドメシル酸塩）の添付文書において「中程度又は強いCYP3A作用を有する薬剤を投与中の患者」への使用が「禁忌」とされ、「相互作用」の「併用禁忌」の項に「中程度のCYP3A阻害剤」として本剤が記載されていることから、「禁忌」及び「併用禁忌」の項の記載内容を更新しました。

※：Company Core Data Sheet：企業中核データシート

医薬品添付文書改訂情報は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ「医薬品に関する情報」<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>にも掲載されています。あわせてご利用ください。

製造販売元  
**アリストル・マイマーズ スクイブ株式会社**  
 東京都新宿区西新宿6-5-1  
 製品に関するお問い合わせ先  
 メディカル情報部 TEL.0120-093-507

RA/2020-05