

## ヤーボイ点滴静注液50mg 副作用件数一覧（速報）

### 【対象】悪性黒色腫（併用療法）

根治切除不能な悪性黒色腫に対して本剤及びオプジーボが併用投与された場合の副作用を集計したものです。

副作用は35例68件です。そのうち、重篤な副作用は25例45件です。

本情報は、医療機関から報告された情報を迅速に提供することを目的としており、調査中の報告など未確定な情報も含まれているため、今後の調査により変更となる場合があります。

収集期間：2018/5/25～2018/11/26

器官別大分類 副作用名 <sup>注1)</sup>	重篤	非重篤	総計 <sup>注2)</sup>
感染症および寄生虫症	3		3
無菌性髄膜炎	1		1
肺炎	1		1
唾液腺炎	1		1
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	3		3
悪性新生物進行	3		3
内分泌障害	6	4	10
副腎機能不全	2		2
下垂体機能低下症		1	1
甲状腺機能低下症	1	2	3
甲状腺炎	1		1
下垂体炎	2	1	3
代謝および栄養障害	3		3
腫瘍崩壊症候群	1		1
食欲減退	1		1
1型糖尿病	1		1
精神障害	1		1
譫妄	1		1
神経系障害	4		4
不全片麻痺	1		1
末梢性ニューロパチー	1		1
末梢性運動ニューロパチー	1		1
痙攣発作	1		1
心臓障害	1		1
心肺停止	1		1
胃腸障害	5	3	8
大腸炎	1		1
下痢	2	3	5
腸炎	1		1
膵炎	1		1
肝胆道系障害	6	6	12
胆嚢炎	1		1
肝機能異常	2	4	6
肝障害	3	2	5
皮膚および皮下組織障害		4	4
ざ瘡様皮膚炎		1	1
そう痒症		2	2
発疹		1	1

器官別大分類 副作用名 <sup>注1)</sup>	重篤	非重篤	総計 <sup>注2)</sup>
筋骨格系および結合組織障害	3		3
関節痛	1		1
筋炎	1		1
横紋筋融解症	1		1
腎および尿路障害	1		1
腎炎	1		1
一般・全身障害および投与部位の状態	5	1	6
死亡	1		1
倦怠感	1		1
発熱	3		3
炎症		1	1
臨床検査	4	5	9
アミラーゼ増加	1		1
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2		2
血中クレアチンホスホキナーゼ増加		1	1
血中乳酸脱水素酵素増加		1	1
血中甲状腺刺激ホルモン異常		1	1
血中甲状腺刺激ホルモン減少	1		1
血小板数減少		1	1
甲状腺機能検査異常		1	1
総計（件数）	45	23	68
総計（症例数）	25	17	35

注1)副作用名は、医療機関からの報告を基に、MedDRA(ICH国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しております。

注2)例数については重篤と非重篤が重複している場合があります。