

ヤーボイ点滴静注液50mg 副作用件数一覧

【対象】腎細胞癌（併用療法）

根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対して本剤及びオプジーボが併用投与された場合の副作用を集計したものです。

副作用は75例158件です。そのうち、重篤な副作用は43例76件です。

本情報は、医療機関から報告された情報を迅速に提供することを目的としており、調査中の報告など未確定な情報も含まれているため、今後の調査により変更となる場合があります。

収集期間：2018/8/21～2018/12/31

器官別大分類 副作用名 ^{注1)}	重篤	非重篤	総計 ^{注2)}
感染症および寄生虫症	4	1	5
蜂巣炎	1		1
インフルエンザ		1	1
髄膜炎	1		1
肺炎	2		2
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	2		2
肝転移	1		1
悪性新生物進行	1		1
血液およびリンパ系障害	2		2
播種性血管内凝固	1		1
汎血球減少症	1		1
免疫系障害	1		1
血球貪食性リンパ組織球症	1		1
内分泌障害	9	1	10
急性副腎皮質機能不全	1		1
甲状腺機能亢進症	5		5
甲状腺障害	1	1	2
甲状腺炎	1		1
下垂体炎	1		1
代謝および栄養障害	2	2	4
低ナトリウム血症		1	1
食欲減退	1	1	2
劇症1型糖尿病	1		1
精神障害		2	2
攻撃性		1	1
易刺激性		1	1
神経系障害	5	3	8
アカシジア		1	1
味覚異常		2	2
意識消失	1		1
重症筋無力症	2		2
末梢性ニューロパチー	1		1
自己免疫性脳炎	1		1
眼障害	1	2	3
複視		1	1
眼の障害	1		1
眼部腫脹		1	1
心臓障害	6		6
心房細動	1		1
心停止	1		1
心不全	1		1
心筋炎	2		2
ストレス心筋症	1		1

器官別大分類 副作用名 ^{注1)}	重篤	非重篤	総計 ^{注2)}
血管障害	2	1	3
高血圧		1	1
低血圧	1		1
ショック	1		1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	3	2	5
呼吸困難		1	1
肺気腫		1	1
間質性肺疾患	2		2
誤嚥性肺炎	1		1
胃腸障害	7	12	19
腹痛		1	1
大腸炎	1		1
下痢	5	6	11
悪心		1	1
消化性潰瘍	1		1
口内炎		2	2
腸管粘膜肥厚		1	1
軟便		1	1
肝胆道系障害	5	5	10
胆管炎	2		2
肝機能異常		4	4
肝炎	1		1
肝障害	2	1	3
皮膚および皮下組織障害	1	16	17
皮膚筋炎	1		1
そう痒症		3	3
乾癬		1	1
発疹		11	11
蕁麻疹		1	1
筋骨格系および結合組織障害	4	2	6
関節炎		1	1
筋力低下		1	1
筋炎	3		3
横紋筋融解症	1		1
腎および尿路障害	7	2	9
頻尿		2	2
腎障害	2		2
腎不全	3		3
腎尿細管障害	1		1
腎機能障害	1		1
一般・全身障害および投与部位の状態	5	22	27
胸痛		2	2
状態悪化		1	1
疲労		1	1
歩行障害		1	1
倦怠感	1	1	2
発熱	3	15	18
体調不良	1		1
炎症		1	1
臨床検査	7	8	15
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2		2
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1		1
血中コルチコトロピン異常		1	1
血中コルチコトロピン減少		1	1

器官別大分類 副作用名 ^{注1)}	重篤	非重篤	総計 ^{注2)}
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	1	2
血中クレアチンホスホキナーゼMB増加	1		1
C-反応性蛋白増加	1	1	2
好酸球数増加		1	1
全血球数減少		1	1
血清フェリチン増加		1	1
白血球数減少	1		1
肝酵素上昇		1	1
傷害、中毒および処置合併症	3	1	4
転倒	1		1
注入に伴う反応	2	1	3
総計（件数）	76	82	158
総計（症例数）	43	51	75

注1)副作用名は、医療機関からの報告を基に、MedDRA(ICH国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しております。

注2)例数については重篤と非重篤が重複している場合があります。