

## ヤーボイ点滴静注液 50mg 重篤な副作用一覧(速報)

ヤーボイ販売開始(2015/8/31)以降に報告された重篤な副作用について、下記にお示します。  
 なお、本情報は、医療機関から報告された情報を迅速に提供することを目的としており、調査中の報告等未確定情報も含まれているため、今後の調査により変更となる場合があります。  
 重篤なもののみ掲載しています。

集計期間: 2015/8/31～2016/2/29

No.	年齢	性別	PS <sup>注2)</sup>	合併症	既往歴	副作用名 <sup>注1)</sup>	初回投与から発現までの日数	転帰
1	60歳代	女性	0	肺転移 肝転移 高血圧 睡眠時無呼吸症候群	無	尿酸素増加	2日	回復
2	50歳代	女性	4	肝転移 リンパ節転移	無	大腸炎	25日	回復
3	70歳代	男性	0	リンパ節転移 胃切除 そう痒症	胃潰瘍 外科手術	心筋梗塞	6日	軽快
4	70歳代	男性	—	髄膜転移	無	肝機能異常	34日	軽快
5	50歳代	女性	—	無	無	口腔粘膜びらん スティーブンス・ジョンソン症候群 肝機能異常 血中ビリルビン増加	40日 — 40日 40日	回復 回復 回復 回復
6	40歳代	男性	0	副腎転移 小腸転移 皮膚転移	ブルガダ症候群 尿細管間質性腎炎 外科手術 外科手術 小腸手術	肝障害	21日	軽快
7	60歳代	男性	—	無	高血圧	大腸炎 下痢	41日 40日	回復 回復
8	80歳代	女性	—	肝転移	無	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	21日	回復
9	50歳代	女性	—	無	無	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	31日 31日	軽快 軽快
10	30歳代	女性	1	リンパ節転移 骨転移 放射線療法 胸膜転移	パニック障害 てんかん 組織球性壊死性リンパ節炎 外科手術	肝障害	28日	未回復
11	60歳代	女性	0	腎転移 リンパ節転移 リンパ節転移 肺転移 貧血 尿道癌	血尿 敗血症	貧血 赤血球数減少	49日 —	軽快 未回復
12	40歳代	男性	4	統合失調症 中枢神経系転移 肝転移 リンパ節転移 骨転移 喘息	放射線療法	脳出血	44日	未回復
13	30歳代	男性	—	無	無	肝障害	41日	回復
14	40歳代	男性	0	肝転移 リンパ節転移 骨転移	癌手術 放射線療法	大腸炎	27日	軽快
15	50歳代	男性	—	無	無	肝機能異常	40日	軽快
16	50歳代	男性	0	中枢神経系転移 肺転移 肝転移 リンパ節転移 骨転移 2型糖尿病	胸部手術 脳放射線療法 インターフェロンγ療法	腸炎	17日	軽快
17	50歳代	女性	0	肺転移 リンパ節転移	外科手術 高血圧 皮膚新生物切除 リンパ節切除 腫瘍切除	副腎機能不全 下垂体炎 下垂体機能低下症	23日 23日 23日	軽快 軽快 軽快

## ヤーボイ点滴静注液 50mg 重篤な副作用一覧(速報)

ヤーボイ販売開始(2015/8/31)以降に報告された重篤な副作用について、下記にお示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を迅速に提供することを目的としており、調査中の報告等未確定情報も含まれているため、今後の調査により変更となる場合があります。重篤なもののみ掲載しています。

集計期間: 2015/8/31～2016/2/29

No.	年齢	性別	PS <sup>注2)</sup>	合併症	既往歴	副作用名 <sup>注1)</sup>	初回投与から発現までの日数	転帰
18	60歳代	女性	—	無	悪性黒色腫	喉頭蓋炎	22日	回復
19	30歳代	女性	—	無	無	貪食細胞性組織球症	—	不明
20	40歳代	女性	1	リンパ節転移 パニック障害 アトピー性皮膚炎	うつ病 アルコール不耐性	肝機能異常	20日	軽快
21	70歳代	女性	1	高血圧 糖尿病 甲状腺機能低下症 類天疱瘡 肺転移 リンパ節転移	自己免疫性甲状腺炎 癌手術 リンパ節放射線療法	類天疱瘡 ミオパチー	6日 —	軽快 未回復
22	70歳代	女性	—	無	無	嘔吐 幻覚	36日 —	回復 不明
23	40歳代	女性	1	肺転移 肝転移 リンパ節転移 骨転移 転移 甲状腺機能低下症	無	大腸炎	30日	回復
24	60歳代	男性	0	中枢神経系転移 肺転移 肝転移 リンパ節転移 転移 皮膚転移	外科手術 脳放射線療法	大腸炎	57日	軽快
25	60歳代	男性	0	狭心症 高血圧 肺転移 脊椎転移 脂質異常症 良性前立腺肥大症 間質性肺疾患 中枢神経系転移 骨転移	胆管炎 大腸炎 癌手術	間質性肺疾患	52日	軽快
26	60歳代	男性	—	無	無	全身性皮疹	—	軽快
27	50歳代	男性	—	無	無	肝障害	92日	軽快
28	40歳代	男性	0	肝転移 リンパ節転移	上咽頭癌 薬物過敏症 癌手術	間質性肺疾患	30日	回復
29	50歳代	女性	—	無	無	間質性肺疾患	71日	未回復
30	70歳代	女性	0	高脂血症 変形性関節症	癌手術	大腸炎 消化管穿孔	33日 76日	軽快 死亡
31	60歳代	女性	—	中枢神経系転移	無	免疫性血小板減少性紫斑病	—	未回復
32	40歳代	女性	0	肺転移 肝転移 骨転移 甲状腺機能低下症	胃食道逆流性疾患 癌手術	肝障害	1日	回復
33	70歳代	女性	2	中枢神経系転移 肺転移 肝転移 リンパ節転移 骨転移 甲状腺機能低下症	腎摘除 子宮平滑筋腫 子宮手術 薬物過敏症	甲状腺機能低下症 下垂体機能低下症	— —	未回復 未回復

## ヤーボイ点滴静注液 50mg 重篤な副作用一覧(速報)

ヤーボイ販売開始(2015/8/31)以降に報告された重篤な副作用について、下記にお示します。

なお、本情報は、医療機関から報告された情報を迅速に提供することを目的としており、調査中の報告等未確定情報も含まれているため、今後の調査により変更となる場合があります。重篤なもののみ掲載しています。

集計期間: 2015/8/31～2016/2/29

No.	年齢	性別	PS <sup>注2)</sup>	合併症	既往歴	副作用名 <sup>注1)</sup>	初回投与から発現までの日数	転帰
34	70歳代	男性	0	慢性B型肝炎 肺転移 リンパ節転移 副腎転移	癌手術	下痢 大腸炎	42日 57日	回復 回復
35	50歳代	女性	—	無	無	下垂体炎 副腎機能不全	— —	不明 不明
36	40歳代	男性	—	無	無	下痢 末梢性ニューロパチー 無力症 ギラン・バレー症候群	— 35日 35日 35日	不明 未回復 未回復 未回復
37	70歳代	女性	—	無	無	C-反応性蛋白増加	1日	軽快
38	60歳代	男性	—	高血圧 肺転移	癌手術	間質性肺疾患	41日	軽快
39	60歳代	男性	—	無	無	間質性肺疾患	77日	回復
40	70歳代	男性	—	糖尿病 肝炎ウイルスキャリアー 肝転移 肺転移	無	肝機能異常	21日	不明
41	60歳代	女性	0	肺転移 骨転移 脳梗塞 排尿困難 高脂血症	無	下痢 感染性腸炎	5日 5日	回復 回復
42	50歳代	男性	—	無	無	筋力低下 握力低下 ギラン・バレー症候群 死亡	— — — 99日	未回復 未回復 未回復 死亡
43	70歳代	男性	—	無	無	蕁麻疹	8日	軽快
44	40歳代	男性	—	無	無	下垂体機能低下症 血中ナトリウム減少 副腎機能不全	27日 27日 —	未回復 未回復 不明
45	50歳代	男性	—	無	無	下垂体機能低下症	—	軽快
46	60歳代	女性	—	無	無	下痢	42日	不明
47	50歳代	女性	—	無	無	性器出血	86日	軽快
48	60歳代	男性	—	無	無	大腸炎	—	軽快
49	60歳代	女性	—	無	無	副腎機能不全	—	軽快
50	高齢者		—	無	無	皮膚障害	—	不明
51	70歳代	男性	—	悪性黒色腫 肝炎ウイルスキャリアー 高血圧 胆嚢転移	皮膚新生物切除 リンパ節切除	間質性肺疾患	22日	未回復
52	40歳代	女性	—	無	無	呼吸困難 間質性肺疾患	90日 —	未回復 不明
53	60歳代	男性	—	無	無	病的骨折	31日	未回復

注1) 副作用名は、医療機関からの報告を基に、MedDRA(ICH国際医薬用語集)の基本語(PT)で記載しております。

注2) ヤーボイ投与開始時のPerformance Status